lües une
premiere fois
lües une 2e. fois

Premiere Observation sur vne Carie Du Tibia Et perone Guerie

N.° 131. bis

Je fus apelé ayambres il ÿ a environ cinq ans, pour voir Le nommé Louis Danois garde Chasse de Mr Bontemps, garçon agé de 18 ans que je trouvay dans son Lit, se plaignant fort d'vn mal quil avoit a la jambe droite, je visitay cette jambe, a la quelle apres avoir oté l'appareil, je trouvay quatre vlceres Considerables Sanieux, remplis de Chairs molasses et fongueuses, savoir trois a la partie anterieure le long du tibia, le premier trois travers de doigts au dessous de la rotule et les deux autres a quel que distance l'un de l'autre toujours sur la meme ligne le tout s'etendoit jusqu'a La partie plus que moyenne du tibia, et Le 4e vlcere etoit situé a la partie moyenne, et posterieure de la meme jambe sur le peroné toute l'extremité etoit Considerablement tu mefiée enflammée, et tres douloureuse Comme Cet vlceres ~~ne~~ ~~paroissoit~~ fournissoient vne grande quantité de pus sanieux noir et de tres mauvaise odeur, je presumay que les os pouvoient etre alterés; et pour m'en asseurer Je pris vn Stilet, que j'introduisis dans chacune de ces playes; Je ne m'etois pas trompé, Le Tibia etoit de Couvert Carie, et pour ainsi dire vermoulu dans la moitié de son epaisseur depuis la tuberosité jusqu'a la partie moyenne; Car Le Stilet au moindre Effort entroit dans La substance de cet os le peroné etoit aussy decouvert et Carié de la largeur d'vn denier. Je m'informay de ses parents, Combien il ÿ avoit de temps que le mal duroit a

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 42 n° 161

Et quelle en Etoit La Cause ; on me dit quil y avoit environs trois
mois que dans une baterie il avoit recu un Coup de baton Sur Los de La
Jambe auquel il navoit pas fait Beaucoup de reflexions dans Le
Commancement, quil Sy etoit fait de La matiere, et que Labsces
Setoit ouvert tout Seul que depuis Ce jour La il avoit eté pancé par
Le chirurgien dun village de Labrie ou il etoit alors, que Le chirurgien
apres Six Semaines de pancement luy ayant dit quil ne pouvoit Le
guerire il Setoit fait aporter ché un de Ses parents a vaugirard
ou Le chirurgien du dit lieu Lavoit encore pansé Six Semaines avec
aussy peu de Succes, pendant Lequel tempts feu Mr figeat chirurgien
des jnCurables avoit Ete plusieurs fois apelé en Consultation au bout
de Ces 3 mois on Le porta a lhotel dieu ou jl ne resta quun jour
par Le que Mr [redacted] luy dit, que pour Le guerire il navoit pas
dautre moyen que de luy Couper La jambe ; Cavoit aussy ete Le
Sentiment de Mr figeat avec qui Je fus apelé en Consultation
pour Le voir, pour moy je Crus que Lon pouvoit luy Sauver La jambe
Je prognostiquay Cependant quil etoit a Craindre que les ulceres
ne restassent fistuleux, vu La profondeur de La Carie ; Cependant
pour parvenir a La Cure Je Comencay a faire une incision Longitu
dinalle depuis La tuberosite du tibia Jusqua Sa partie moyenne,
pour mettre toute La Carie a decouvert, et pouvoir appliquer plus
jmmediattement Les Topiques Capables de procurer Lexfoliations
de La partie alteré de Los, de Sorte que des trois ulceres de La partie
anterieure Je nen fis quun Jebarbay Les Calosites des bords, Et
Jemportay toutes Les mauvaises chairs, Je fis La meme manoeuvre
a Lulcere qui etoit Situé Sur Le perone ; dans Les pansements

suivante je mis en usage sur la Carie des plumaceaux trempé
dans un melange de teinture de myrrhe et daloës le Camfre le
sel ammoniac et Lesprit de Therebentine, et sur les chairs un
digestif animé ordinaire ; Comme il y avoit un sinus qui de la
partie anterieure et moyenne de la jambe alloit se rendre dans
lullere posterieur, j'y fis des injections vulneraire et detersives,
au moyen de lusage Continué de ces remedes, la Carie des os
s'exfolia il en sortit a diverses fois plusieurs esquilles assés
grosses ; Les ulleres se mondifierent, Les os se recouvrirent de
bonnes chairs, le sinus se recolla au moyen des Compresses
Expulsives, et la Cicatrice fut parfaite au bout de six mois
sans quil soit resté de fistule la Cicatrice est enfoncée ~~d~~ a
~~[illegible]~~ un doigt et paroit adherente a los, Ce qui est ordinaire
dans tous les Cas de carie, surtout apres une perte de substance
de los aussy Considerable

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Reflexions

Il est a presumer que par le Coup de baton que le jeune homme
recut a la partie anterieure de la jambe ou los na dautre te-
guments que la peau, le perioste et la substance de los meme
fut violemment Contuse ; Ce qui ayant ~~e~~ Eté negligé il survint
inflammation dans la continuité du perioste qui degenera en suppu
ration ; Le pus par son sejour, et par la mauvaise qualité quil a
Coutume davoir, quand il se forme pres des parties osseuses et
membraneuses, Le pus dis je, rongea le perioste, detruisit meme les
fibres osseuses ; ~~[illegible] et peut~~

~~Etant pour l'impéritie des premiers chirurgiens qui le pansoient et~~
~~qui fut calmé par la bonne manœuvre que j'employai, au moyen~~
de ~~laquelle je lui sauvaij cette jambe qu'on vouloit amputer~~

Mongniot

Seconde Observation sur un depôt dans la gaine des muscles droits du bas ventre

Je fus mandé il y a plusieurs Années pour voir Mr de La Tour Maitre d'hotel de Monsieur Le Marquis de Livry qui avoit fait il y avoit environ un mois une chute de la hauteur de douze pied, Etant sur une Echelle qui en tombant se trouva sous luy: il n'avoit paru aucune Contusion en aucune partie, il se plaignoit seulement d'une vive douleur a la region ombilicale deux travers de doigts au dessous et a côté de l'ombilic; Mr Ledran le pere qui vivoit alors Le saigna plusieurs fois. et luy fit apliqué sur la partie douloureuse des fomentations spiritueuses et resolutives ce qui fut continué sans succes pendant un mois entier; ce fut pour lors que je fut apelé en Consultation; Il ne paroissoit aucune tumeur distincte a l'exterieur du ventre mais seulement une Dureté resistante dans toute la region OMbilicalle; Je presumaij cependant vue La durée et la vehemence de la douleur Et La fievre Continüe qu'il se faisoit supuration dans l'interieure de La partie J'y fis apliquer des Cataplasmes Emollients et maturatifs qui en trois jours ramollirent La partie et firent paroitre une tumeur circonscripte avec un Commancement de fluctuation; enfin au bout de huit jours le depost fut en etat d'etre ouvert, Ce que j'executaij en presence de Mr de magnij

Docteur en medecine de la faculte de paris et de Mr Ledran pere;
jl sortit par cette ouverture plus d'une Ecuellée d'un pus
grisatre foetide et assez Epais, le foyer de labcès etoit sous
l'aponevros du muscle droit, je fus obligé de la debrider en
tous sens, pour detendre, Et relacher la partie, et pour faciliter
une issue libre au pus: le malade fut pancé selon les regles
de l'art, et fut geurie dans lespace de six semaine

Reflexions

jl est a presumer que dans la chute que fit le Blessé; sur le
ventre, le muscle droit et sa guaisne furent violemment
contus part quelque partie de lechelle sur laquelle jl
tomba de la hauteur de douze pied, quil y eut des vaisseaux
meurtris et meme dechirer, et quil se fit vn Epanchement de
sangt dans cette gaine que le sangt ne put reprendre les voyes de la circulation, malgré
tous les secours que lon mit en vsage pour cet Effet jl nest donc
pas Etonnant que les douleurs du malade nayent pas diminuer
et meme ayent toujours été en augmentant vu le sentiment
exquis de l'aponevrose et de la distention que le sang Epanché
y causoit jl est encore moins surprenant que la tumeur ne fut
que peut sensible au dehors vu la substance dense et compacte
de cette aponevrose il y a meme lieu de croire que sy lon neut
pas donné jour promptement au pus qui y sejournoit le pus auroit
pu, en detruisant le feuillet posterieur de laponevrose du muscle
droit sepancher sur le peritoine et peut Etre dans la capacité
Du ventre,

Mongniot

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Troisieme Observation sur une Tumeur Squirreuse dans Le duodenum

Jay vu Conjointement avec plusieurs Medecins de la faculté, Madame
De Guenegaud agé de 77 ans, pendant une maladie qui luy dura
Trois ans au bout des quels elle mourut: elle se plaignoit d'une Douleur
tres vive a la partie jnferieure de La Region Epigastrique directement
audessous de fond de Lestomach et du moÿen Lobe du foÿe a Compagné
de pesanteur et degout; quelque fois de vomissement chÿleux et pres
que toujours de fievre Lente jl ne paroissoit point de tumeur a Lexterieur
mais Lon y sentoit une dureté profonde qui setendoit environ de la
Largeur de la paume de La main; on luy fit un grand nombre de
Saignées des bras et des pieds elle fut baignée, purgee prit Les
aperitifs, et Les fondants de touts genres, et plusieurs especes deaux
minerales; car Les medecins pensoient quil y avoit squirre au moÿen
Lobe du foÿe ou au pancreas; apres Le grand nombre de remedes
Employés durant 3 ans sans aucun succes elle mourut; Jen fis
Louverture, je trouvaÿ a La region cy dessus designée, une tumeur
de La grosseur du poing qui me parut Composée de plusieurs autres
petites tumeurs rassemblees apres un Examen attentif je reconnus
que cette tumeur etoit situé dans Lintestin duodenum, je Louvris,
elle me parut tres adherente au velouté et a la propre substance
de cet jntestin, dont par Consequent ~~Le diametre~~ La cavité jnterieure de + etoit remphi beaucoup ~~[illegible]~~ je fis Louverture
Cette masse squirreux qui Comme je Laÿ deja dit etoit Composée
de douze ou quinze tubercules ~~[illegible]~~ Carcinomateux de la
grosseur et figure des dez a jouer Lisses et polis exterieurement
ne pouvant qu'a peine etre Coupés par Linstrument tranchant;
toutes Les autres parties du Corps etoient dans Leur etat naturel

Reflection

Il n'est pas Etonnant que la ditte Dame fut Sujette pendant —
sa vie a des degouts et vomissement frequents; La diminution —
du diametre de l'intestin duodenum par la presence de cette tumeur
ne pouvant permettre un passage libre aux liqueurs chilouses —
Et bilieuse quelles obligeoient de retrograder vers l'estomach;
et de produire les susdits accidents; La douleur ne peut etre —
Expliquée que par la distention que la tumeur Causoit aux —
Tuniques de cet jntestince, et la Compression quelle faisoit aux
parties voisines, et le Tiraillement que sa pesanteur y occasionoe
Pour ce qui est de l'origine de cette tumeur je pense que ce n'est —
autres chose que le gonflement des glandes de Brunnerus qui
sont en grand nombre dans cet jntestin, gonflement qui leur
est survenu de la meme maniere quon le voit arriver aux —
autres glandes Conglomerees par l'engorgement et l'arrest des
liqueurs dans leurs vaisseaux, et qui a augmenté par la suite,
de maniere a les rendre de substance Carsinomateux au poing —
ou je les trouvaij, jay oublie de mette que je l'aij en baume

Mongniot

Carie et tumeurs
par M. Mongniot
Employé

au Carton - lue 2 fois